




### Cyto-Raizan® 600 Amin Bio-Enraizador Sólido con Aminos y Ácidos Fúlvicos



### Información General

#### Descripción:

**Cyto-Raizan® 600 Amin** es un nuevo nutriente diseñado para promover y estimular el desarrollo de raíces. En plantas sembradas directamente por semillas, o bien en cultivos trasplantados, el desarrollo es más rápido y vigoroso.

**Cyto-Raizan® 600 Amin** está formulado en forma balanceada con N, P, K, Magnesio (Mg) y Azufre (S) complementado con promotores biológicos de crecimiento y de Ácidos Fúlvicos.

#### Beneficios:

- Estimula el desarrollo de raíces.
- Ayuda el enraizamiento de plantas trasplantadas.
- Plantas con adecuado desarrollo, tanto de la parte aérea como de raíces.
- Adecuado aprovechamiento de los nutrientes.
- Los Ácidos Fúlvicos mejoran la disponibilidad de los micronutrientes en el suelo y mejoran la toma de los mismos.

### Composición Garantizada

	%
Nitrógeno (N).....	10.00
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ).....	40.00
Potasio (K <sub>2</sub> O).....	10.00
Magnesio (Mg).....	0.70
Azufre (S).....	0.80
Inertes hasta.....	100.00

#### También Contiene:

Ácidos Fúlvicos y  
Aminoácidos (3.5%)

### Recomendaciones y Dosis

Cultivos	Dosis	Recomendaciones
Col, Brócoli, Tomate, Lechugas, etc.	Almácigos 0.4 a 0.75 kg por bulto de sustrato en 100 litros al 1%. Trasplante: 40-60 cc de solución al 1% por planta. Planta establecida: 2 a 3 kilos por hectárea.	Mezclar bien con sustrato. Regar con solución al 1% en plántulas de 3 a 5 hojas cada 3er. día. Después del trasplante aplicarlo en el cajete (hoyo) o a la base (pata) de la planta. Asperjar con suficiente agua a los 15 y 30 días del trasplante.
Ajo, Espárrago y Fresa.	Almácigos 0.40 a 0.75 kg por bulto de sustrato en 100 litros de agua. Trasplante: 40 - 60 cc de solución al 1% por planta. Planta establecida 2 a 3 kilos por hectárea.	Mezclar bien el sustrato. Regar con solución al 1% en plantas de 3 a 5 hojas y cada 3er. día. Sumergir raíces durante 3 a 5 minutos en la solución al 1%. Asperjar con suficiente agua a los 15 a 30 días del trasplante.
Tabaco	En almácigos con solución al 1% regar bien. Trasplante: 40 a 60 cc de solución al 1%. Planta establecida 2 a 3 kilos por hectárea.	En plántulas de 3 a 5 hojas. Aplicar a la base (pata) de las plantas. Asperjar vía foliar a los 15 y 30 días del trasplante.
Berenjenas, Aguacate, Chicharo, Frijol, Melón, Papa, Pepino, Sandía y Zanahoria.	En plantas con 3 a 5 hojas usar 10 a 15 kilos por hectárea. Planta establecida de 2 a 3 kilos por hectárea.	Aplicación en banda con suficiente agua y dirigir a la base (pata) de las plantas. Asperjar vía foliar a los 15 y 30 días de trasplante.
Arroz, Cebada y Trigo	En plantas con 15 a 25 cm de alto: 4 a 6 kilos por hectárea. Planta establecida: 2 a 3 kilos por hectárea.	Aplicar a la base (pata) de las plantas. Asperjar por vía foliar a los 15 a 30 días.
Maíz	A la siembra 4 a 6 kilos por hectárea. Planta establecida: de 2 a 3 kilos por hectárea.	Al momento de la siembra en solución en agua a 5 cm de la semilla. Asperjar por vía foliar a las 6 a 8 hojas y repetir a los 25 días.
Alfalfa	Aplicar de 3 a 4 kilos por hectárea.	Asperjar vía foliar cuando las plantas tengan de 3 a 5 hojas después del corte.
Caña de Azúcar	Aplicar de 5 a 10 kilos por hectárea..	1ª Aplicación asperjar 10 kilos por hectárea en etapa de "pelillo". 2ª Aplicación asperjar 5 kilos por hectárea 15 días después.
Arboles Frutales y Forestales.	Viveros: usar de 100 a 200 cc al 1%. Trasplante: usar de 10 a 20 litros de solución al 1% por planta. Planta establecida: 1 a 2 kilos por planta.	Aplicar a la base (pata) de la planta. Usar suficiente agua a la base (pata) de las plantas. Aplicar generosamente en agua al cajón previo al riego.

### Características

**Tipo de Producto:**  
Sólido

**Solubilidad:**  
100%

**pH:**  
3.50

**Apariencia:**  
Polvo Soluble, Café Claro

**Densidad:**  
0.865

**Función del Producto:**  
Bio-Enraizador Sólido con  
Aminos y Ácidos Fúlvicos.

### Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

El producto está diseñado para ser aplicado vía foliar. Para esto le recomendamos que abra el envase por un costado con un objeto cortante y vacíe la cantidad a aplicar en un bote con agua y hacer una premezcla, agite vigorosamente y vacíelo al tanque de mezclado con agua a la mitad de su capacidad y vuelva a agitar hasta lograr uniformidad, llene el tanque de agua y realice las aspersiones con su equipo de aplicación manual, montado al tractor o vía aérea, procure una cobertura total.

Siempre calibre su equipo de aplicación.

#### Compatibilidad:

**Cyto-Raizan® 600 Amin** es compatible con todos los agroquímicos; sin embargo recomendamos hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos.

**Presentación:** 1 y 2 kg.