

# MANZANO

## PRODUCTOS A UTILIZAR:

### PRODUCTOS FOLIARES

**Paq. Crecimiento chico**  
**2 Paq.**  
 Cada paq. consta de:  
 Cyto-Crop® 1/4L/ha  
 AgroStim® 1/4L/ha  
 Winer Fol®  
 (20-30-10) 1kg/ha

**Paq. Floración Grande**  
**2 Paq.**  
 Cada paq. consta de:  
 Cyto-Crop® 1/2L/ha  
 AgroStim® 1/2L/ha  
 Winer Fol® 77  
 (15-40-3) 2kg/ha

**Paq. Maduración Grande**  
**2 Paq.**  
 Cada paq. consta de:  
 Cyto-Crop® 1/2L/ha  
 AgroStim® 1/2L/ha  
 Cyto-K® Excel (0-26-40)  
 + Boro + Zinc 2kg/ha

**Magic-Gro® 77**  
**2 L.**  
 (Bionutriente foliar líquido)



### PRODUCTOS AL SUELO

dosis de 100g/árbol de un año.

**Raíz-Set® Hydro**

(Aditivo biocatalizador y retenedor de agua)

10 kg.

**Raíz-Set® LSS**

(Aditivo y biocatalizador)



**Zona de goteo**

### RECOMENDACIONES Y DOSIS:

PRODUCTO	DOSIS	APLICACIÓN
Raíz-Set® Hydro	Mín. 100 g/árbol	Mezclar con el fertilizante recomendado dosis de 100 g/árbol tomando como inicio árboles de 1 año, incrementando dosis de 100 g x año. Se aplica en el segundo tercio de la zona de goteo.
Raíz-Set® LSS	10 kg/ha	Aplicación de 10 kg/ha vía suelo 8 días después de incorporar el Raíz-Set® Hydro en el segundo tercio de la zona de goteo.
Paq. Crecimiento (Chico)	2 paq.	1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de brotación + ½ L/ha de Magic-Gro® 77. 2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 15 días posteriores + ½ L/ha de Magic-Gro® 77.
Paq. Floración (Grande)	2 paq.	1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de floración + ½ L/ha de Magic-Gro® 77. 2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 15 días posteriores + ½ L/ha de Magic-Gro® 77.
Paq. Maduración (Grande)	2 paq.	1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de llenado. 2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 15 días posteriores.